

請保存此說明書供日後參考。服用之前請務必仔細閱讀此說明書。

樋屋兒童綜合感冒糖漿藥水 S <感冒藥>

指定第二类医药品

“樋屋兒童綜合感冒糖漿藥水 S”是紓解因傷風、感冒所引起之相關的症狀，如發燒，咽喉痛的感冒藥。獲認可供年齡由3個月~7歲的兒童服用。

不含糖份(含木糖醇) 不含咖啡因 草莓味-兒童容易入口的口味 無人造色素 防兒童開蓋設計

#### 使用注意事項

(雖然 樋屋兒童綜合感冒糖漿藥水 S是兒童感冒藥，服用時需採用一般感冒藥的注意事項)。

[要避免] (不遵守以下事項可能導致感冒症狀惡化或引起不良反應)

1. 下列人士服用本藥前需諮詢醫生，藥劑師，或認可銷售代理：(1)對同類藥物或本藥的任何成份有過敏反應 (2)服用這種藥物或任何其他感冒藥、解熱鎮痛藥後出現症狀哮喘 2. 本藥不應與下列藥物配合使用：含其它感冒藥，解熱劑和止痛劑，鎮靜劑，止咳化痰，或抗組胺藥(鼻腔粘膜炎，動暈症，或抗過敏劑，等口服藥物) 口服藥物 3. 不要開車或服用本藥後操作機器。(本藥可能引起昏昏欲睡) 4. 服用前或服用本藥後不要飲酒。 5. 不要長時間服用本藥。

[請就以下情況諮詢醫生]

1. 有以下情況的人士,服用前請諮詢醫生、藥劑師或認可銷售代理：(1)正接受醫生或牙醫藥物診治

(2)孕婦或有懷孕徵兆婦女 (3)哺乳期間 (4)年老長者 (5)有藥物過敏症狀記錄人士 (6)任何人有以下症狀：發高燒，排尿困難 (7)有以下病歷：甲狀腺疾病，糖尿病，心臟病，高血壓，肝病，腎病，胃/十二指腸潰瘍，青光眼

2. 本藥可能引起下列不良反應。如出現這些反應，應立即停止服用本藥，及帶同此說明書去諮詢醫生，藥劑師或認可銷售代理

皮膚：皮疹，紅腫，痕癢 中樞神經系統：頭暈 消化器官：噁心，嘔吐，食慾不振

泌尿系統：排尿困難 其他：體溫顯著下降

在極罕有情況下可能會出現以下嚴重症狀。在這種情況下，應立即求醫。

· 休克(過敏性反應)：皮膚痕癢，麻疹，聲音沙啞，打噴嚏，喉嚨痕癢，呼吸困難，心悸或意識模

糊等

· 皮膚粘膜眼症候群(史蒂芬強生症候群)，毒性表皮溶解症，急性廣泛發疹性膿疱症：持續或突然

惡化症狀...高燒，眼睛發紅，眼睛釋出分泌物，唇口糜爛，咽喉疼痛，廣泛皮膚範圍出現

## 皮疹或

紅斑，紅色圓形皮膚膿疱，精神萎靡，食慾不振等。

· 肝功能衰竭：發熱，痕癢，皮疹，黃疸(皮膚和眼白變黃)，棕色尿，一般煩躁不安，食慾不振等。

· 間質性肺炎：突發性或持續出現以下症狀...上樓梯或勞累之後呼吸急促或感到窒息，乾咳，發熱等

· 哮喘：喘息和呼吸困難

· 再生障礙性貧血：瘀斑，流鼻血，牙齦出血，發熱，皮膚蒼白和帶有黏液，乏力，心悸，氣促，

感覺不適和頭暈，尿中有血等

· 粒性白血球缺乏症：突發高燒，畏冷，咽喉痛等。

· 腎功能不全：發熱，皮疹，尿量減少，一般腫脹，全身倦怠，關節痛，腹瀉等。

3. 服用本藥可能出現以下症狀。如果這些症狀持續或加重，請停止服用，並諮詢醫師，藥師，及帶同此說明書去諮詢醫生，藥劑師或認可銷售代理...口乾，昏昏欲睡

4. 如服用本藥 5~6 次後仍未見功效，立即停止服用本藥並帶同此說明書去諮詢你的醫生，藥劑師或認可銷售代理。

## 主治

感冒症狀 (流鼻涕，鼻塞，噴嚏，咽喉痛、咳嗽、喀痰，畏寒，發熱，頭痛，關節痛和肌肉酸痛)

## 成份 (每 48 mL)

主要成份：Acetaminophen...300 mg Chlorpheniramine maleate...2.5 mg

dl-Methylephedrine hydrochloride...20 mg

添加物：Xylitol, Hydrogenated maltose starch syrup, Sodium chloride, Citric acid, Sodium citrate, Saccharin sodium, Sodium benzoate, Paraben, Propylene glycol, and flavor

## 用法與用量

3 歲以上至 7 歲...8 mL    1 歲以上至 3 歲以下...6 mL    6 個月以上至 1 歲以下...4.5 mL

3 個月以上至 6 個月以下...4 mL    3 個月以下...禁止服用

1 日 3 次，於飯後 30 分鐘內服用。視乎情況需要，一日最多可服用 6 次，每次需間隔 4 小時

[注意事項] (1)請遵照建議劑量和服法 (2)此藥應在成人監督下給兒童服用 (3)2 歲或 2 歲以下兒童，服用前請諮詢醫生

## 儲存和處理-注意事項

(1)請確保包裝密封，並儲存在陰涼乾燥的地方，避免陽光直射 (2)請存放在孩童接觸不到的

地方

(3)為避免誤服及確保質量，切勿把此藥存放到另一個容器 (4)切勿服用過期藥 (5)為確保藥效，切勿服用開封後儲存過久的藥。

發 売 元

樋屋奇応丸株式会社

〒530-0043 大阪市北区天満 1-4-11

製造販売元

萬金藥品工業株式会社

〒634-0145 奈良県高市郡明日香村野口 317