儿童用解热药

奇应热

儿童解热栓剂

第二类医药品

- ◎ 儿童正常体温高于成年人,稍许发热也会保持活跃。而当发高烧(一般为38°C以上)时,会消耗体力甚至出现发热性惊厥, 因而务须确保退烧。
- 奇应热药剂成分直接通过肠道吸取,不伤胃,效力快,可有效解热。

$\hat{\mathbb{N}}$

使用时的注意事项

本药剂为幼儿用药,但解热药所规定的一般性注意事项都有记述。



禁忌事项

(不遵守以下事宜,会使目前症状恶化,或易发生副作用及事故)

- 1. 以下情况者禁用。
- (1)对本药剂或本药剂成份有过敏史者。
- (2) 曾因使用本药剂或其他解热镇痛药剂、感冒药而引发哮喘者。
- 2. 使用本药剂期间,禁用下列任一种医药品。 其他解热镇痛药剂、感冒药、镇静剂
- 3. 使用前后不可饮酒。
- 4. 不可长期连续使用。



咨询事宜

- 1.以下情况者使用前,须向医师、牙科医师、药剂师或注册经销商咨询。
- (1)正接受医师或牙科医师治疗者。 (4)对药品等有过敏史者。
- (2)妊娠或可能妊娠者。
- (5)确诊为下列疾患者。
- (3)高龄者。
- 心脏病、肾脏病、肝脏病、胃戌十二指肠溃疡
- 2.服用后,如出现以下症状,可能为副作用,应即刻停止使用,并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询。

相关部位	症状		相关部位	症状
皮肤	发疹・发红,	发痒	精神神经系统	眩晕
消化器官	恶心・呕吐、	食欲不振	其他	体温过低

偶有发生下记危重病症者, 应立即接受医师诊治。

阿内及工 I 也也主从走台,在立外及文色师移山。					
症状名	症状				
过敏性休克	使用后即刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、嗓音嘶哑、喷嚏、喉咙瘙痒、呼吸困				
以敬任怀先	难、心悸、意识模糊等症状				
皮肤黏膜眼综合症(史蒂文斯-约翰逊综合症),中	高烧、眼睛充血,眼眵、嘴唇发炎、喉咙疼痛、皮肤大范围发疹、发红、				
毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病	皮肤泛红处出现小脓包,全身倦怠、食欲不振等症状持续、或急剧恶化。				
肝机能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸(皮肤及眼白变黄)、棕褐色尿、全身倦怠、				
カナがに自とり草が守	食欲不振等症状。				
间质性肺炎	上楼梯或轻微用力即会喘息、胸闷、干咳、发热等症状突发,或持续发生。				
哮喘	表现出呼吸时有哮鸣音,呼吸费力等。				
肾功能不全	出现尿量减少、发热、发疹、全身浮肿、全身倦怠、关节疼痛、腹泻等。				

3.使用一次后,症状仍无改善者,应停止使用,并持本说明书向医师、牙科医师、药剂师或注册经销商咨询。

(请务必阅读背面。)

功能仄主治

儿童发热时一时解热用



夜间等忽然 发热时用



不便经口饮用时 (易吐、不思进 食、咳嗽严重等) 用

用法仄用量

将以下用量插入肛门内。

年龄	1 岁未满	1~2岁	3~5岁	6~12岁
一次 用量	禁用	1/2~1 个	1 个	1~2个
使用 次数			1日1次	

〈注意〉

- (1) 应在监护人指导监督下使用。
- (2) 务必严守规定的用法和用量。
- (3) 不可用于未满 1 岁的婴儿。
- (4) 用药限定1日1次,不可连续二日使用。
- (5) 只限用于肛门,不可内服。

使用 1/2 个栓剂时



沿斜线用割刀 或剪刀截断,按 使用3个栓剂的 方法使用。

栓剂的使用方法

为使药剂不被排出,应尽量于排便后使用。







从尖段处开启。

插入到肛门深处。仰卧易于插入。插入不易时,用橄榄油或水涂抹尖 端处,以助润滑。为使栓剂不被排出,务必用手指推抵数十秒时间。

发热时的注意事项

- 〇汗水浸湿的衣服应尽早更换。
- 〇发热出汗会流失水分。水分应充分补给。
- 〇发热而畏寒时, 应使身体温暖。
- 〇使用冰枕等使头部降温,会感到舒适。但不致于解热。如被嫌弃,不必强制降温。

贮藏注意事项

- (1)避开直射日光,置30°C以下阴凉处(冰箱等), 按右图所示将栓剂尖端向下, 竖立保管。
- (2)保管于儿童无法触及之处。
- (3)为避免误用,保持品质,请勿换装其他容器。

外倉正面

解热栓剂



(下)

关于本制品的咨询,请向购买店或下记地址联系 顾客咨询室 樋屋制药株式会社 电话: 072-871-2990 邮编 574-0014 大阪府大东市寺川 3-3-63 接待时间 9:00~17:30(节假日除外)



樋屋奇应丸株式会社 〈生产商〉

邮编 530-0043 大阪府北区天满 1-4-11

〈制药经销单位〉樋屋制药株式会社大阪工厂 邮编 574-0014 大阪府大东市寺川 3-3-63